



Roek *Corvus frugilegus*



Middelgrote kraaiachtige, geheel zwart met blauwe glans en met afhangende 'broek'. Snavelbasis en keel van volwassen vogels voorzien van kenmerkende grijs-witte, naakte huid.

Foto: Rein Hofman



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Nesten zijn jaarrond beschermd. Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Nesten zijn jaarrond beschermd. Waar de soort (mogelijk) voorkomt alleen snoeien in de periode van augustus t/m februari, daarbij nesten ontzien. Roeken broeden hoog in boomkronen.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	-
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt: van augustus t/m februari.
Afdammen/dempen/vergraven	-
Leefgebied	Opstanden van hoge bomen (broedplaatsen) nabij graslanden of bouwland (foerageergebied). Kolonies worden ook gesticht in dorpen en steden mits het platteland op korte afstand gelegen is. Vaak in populierenbosjes langs snelwegen, tankstations of knooppunten.
Gebruik van het leefgebied	Broedt en slaapt groepsgewijs in hoge bomen, maar foerageert bijna uitsluitend op de grond, zowel in graslanden als op akkers. Zwerft 's winters vaak groepsgewijs rond in de omgeving van de kolonie, maar trekt bij streng winterweer weg.
Voornaamste voedselbronnen	Alleseter: ongewervelden, vooral kevers en regenwormen, oogstresten, noten, zaden en vruchten.
Leefwijze door het jaar heen	Kolonievogel, maar vormt daarbinnen paren voor het leven. De broedperiode loopt van begin maart tot eind juli. Eieren en nesten met jongen vanaf eind maart tot begin juni. Vliegvlugge jongen in de buurt van de nestlocatie tot diep in juli.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Roek *Corvus frugilegus*

Locatie nest	Hoog in de boomkronen.
Aanbevelingen	Let op: nesten zijn jaarrond beschermd. Niet door roeken gebruikte nesten kunnen ook worden overgenomen door roofvogels en ransuilen.
Belang Waterschapspopulaties	Nationaal belang.
Verspreiding binnen Nederland	Komt in Nederland algemeen voor in met name de oostelijke helft van het land, vooral in gebieden met veel graslanden, beekdalen en nabij de grote rivieren. Niet in uitgestrekte bosgebieden (centrale Veluwe etc.). Ontbreekt tevens in Zeeland, Flevoland, op de Waddeneilanden en in grote delen van Noord- en Zuid-Holland.
Rode lijst 2004	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn geen Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3. Jaarrond beschermd nest.
Bronnen	Literatuur: Bijlsma <i>et al.</i> 2001; LNV, 2009; Snow & Perrins 1998, SOVON 2002 Websites: www.minlnv.nl , www.nederlandsesoorten.nl .

