



Roerdomp *Botaurus stellaris*



Grote, compacte reiger, met een relatief korte, dikke hals. Verenkled geelbruin gebandeerd.

Foto: Ewoud van der Ploeg

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien

Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september t/m februari. De roerdomp broedt in een kolonie in moeras met vegetaties van riet en lisdodde.

Schonen

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.

Baggeren

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.

Snoeien/dunnen

-

Onderhoud waterkeringen

-

Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken **Zie gedragscode**

Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Zie gedragscode

Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september t/m februari. De roerdomp broedt in een kolonie in moeras met een vegetatie van riet en lisdodde.

Sloop kunstwerken/gebouwen

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.

Bouwactiviteiten

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.

Afdammen/dempen/vergraven

Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.

Leefgebied

Broedt in grote rietmoerassen met ongemaaid riet en lisdodde. Verblijft in de winter ook in kleine rietlanden en rietoevers.

Gebruik van het leefgebied

In het broedseizoen in uitgestrekte rietmoerassen. Buiten het broedseizoen in zowel grote als kleine rietlanden.

Voornaamste voedselbronnen

Vis, amfibieën, kleine zoogdieren en kleine aquatische organismen.

Leefwijze door het jaar heen

De broedperiode loopt van begin maart tot eind augustus. Vanaf begin maart balts en van midden maart- eind augustus nesten en paren met jongen. Buiten de broedperiode verspreid voorkomend.

Vervolg: zie pagina 2



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker





Vervolg

Roerdomp *Botaurus stellaris*

Locatie nest	In dichte rietvelden.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.- Soortgericht beheer. Ondermeer het stimuleren van natuurlijk waterpeilbeheer en de ontwikkeling van een structuurrijke moerasvegetatie (maatwerk).
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland schaars tot plaatselijk algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in Noord-Holland, Overijssel, Friesland en Flevoland.
Rode lijst	Bedreigd
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: den Boer <i>et al.</i> , 2000; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

