




Tabel 2

Ronde zonnedaaw *Drosera rotundifolia*



Een insectenetende plant van 0,5 tot 30 cm groot. De bladeren hebben rode tentakels met daarop kleverige vochtdruppeltjes. De bloemen zijn klein en wit. Onderscheid met de andere zonnedaawsoorten: rondere bladeren, die plat tegen de grond gedrukt zijn en een behaarde bladsteel.

Foto: Klaas van Haeringen/Buiten-Beeld



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Jaarlijks maaien. Bij voorkeur in september-oktober.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode, aanvullend: Extensieve begrazing is mogelijk.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige, plotselinge ingrepen in de waterhuishouding doorvoeren.

Groeiplaats
 Een plant van open, natte, zure grond op zand en veen. De soort is karakteristiek voor natte heidevegetaties en hoogveenvegetaties en kan daarnaast voorkomen in natte, kalkarme duinvalleien en in laagveengebieden (veenmosrietland, veenheide). Ook wel op kale plekken langs slootkanten. Ronde zonnedaaw verdraagt geen langdurige winterinundatie. De soort groeit meestal in min of meer stabiele vegetaties tussen veenmos, en treedt minder vaak op als pionier, in vergelijking met de verwante soort kleine zonnedaaw.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Ronde zonnedauw *Drosera rotundifolia*

Leefwijze door het jaar heen	Bloeiperiode: juni-augustus. Zaadverspreiding van augustus tot in de herfst door wind, dieren en regenwater. Het zaad blijft 1-5 jaar kiemkrachtig. Het zaad ontkiemt pas na een vorstperiode. De plant vermeerderd zich ook vegetatief via broedknoppen. De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen op of onder de grond.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Niet bemesten.- Niet ontwateren.- Voorkom verbossing, eventueel door beheer van maaien en afvoeren, voorzichtig plaggen of (zeer) extensieve begrazing.- Stimuleren van veenmosgroei (drijvend of op land).
Verspreiding binnen Nederland	Verspreid door Nederland. Niet in Zeeland.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005. Schaminée <i>et al.</i> , 1995. Websites: flora.instnat.be ; www.soortenbank.nl ;