




Tabel 3

## Rugstreepad *Bufo calamita*



Middelgrote pad (6 tot 7 cm). De rug is bruin/geel/groen en heeft een opvallende gele streep. De buik is lichter van kleur met donkere vlekken. De huid is sterk wrattig met vaak rode, oranje of gele vlekken op de wratten. Een rugstreepad springt niet, maar loopt als een muis.

Foto: Christophe Brochard




Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Vanaf augustus tot oktober.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Vanaf half augustus tot half maart.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Vanaf half augustus tot april.
Begrazen	Zie gedragscode, aanvullend: Extensieve begrazing toelaten.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Houdt ondiepe waterzones vrij van opslag van bomen.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Wees tijdens werkzaamheden alert op voortplantende rugstreepadden. Indien aanwezig wegvangen en verplaatsen naar geschikte locaties.
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Werkzaamheden op het land van half maart t/m september. Wees tijdens werkzaamheden alert op voortplantende rugstreepadden. Indien aanwezig wegvangen en verplaatsen naar geschikte locaties.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Werkzaamheden op het land van half maart t/m september.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode Wees tijdens werkzaamheden alert op voortplantende rugstreepadden. Indien aanwezig wegvangen en verplaatsen naar geschikte locaties.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode Van half augustus t/m half maart.
Leefgebied	In terreinen met een vrij open vegetatie en een zandbodem. Dit zijn vaak terreinen met een pioniermilieu of een dynamisch milieu zoals afgravingen, opgespoten terreinen, zandverstuivingen, industrieterreinen, braakliggende terreinen, militaire oefenterreinen, akkers, heideterreinen, duinen, etc. Daarnaast ook in nieuwe poelen en in zand- en poldersloten.



○ soort niet waargenomen  
● soort (recent) waargenomen

3



## Vervolg

## Rugstreepad *Bufo calamita*

Gebruik van het leefgebied	<p>Voortplanting in ondiepe of droogvallende, niet of weinig begroeide wateren die snel opwarmen met een pH lager dan 5. De larven tolereren kortstondig een temperatuur van 40°C en relatief hoog zoutgehalte.</p> <p>Op het land houden de dieren zich verborgen in zelf gegraven holen (tot een diepte van 15-45cm), holen van knaagdieren, onder stenen en tussen muurspleten. De pad overwintert vaak in zelf gegraven holen in het zand (soms wel tot een meter diep). De schuilplaatsen liggen vaak niet meer dan 20 meter van het voortplantingswater verwijderd. Voortplanting en de ontwikkeling van de larven vindt plaats in het water. De larven leven vooral solitair op de bodem van het water; langs vlakke, warme randen van het water kunnen ze echter scholen vormen. Volwassen padden kunnen zeer slecht zwemmen en kunnen alleen op zeer ondiepe plekken in het water zitten. Rugstreepadden kunnen grote afstanden afleggen en goed nieuwe terreinen koloniseren.</p>
Voornaamste voedselbronnen	Insecten, kevers, wormen, spinnen, rupsen. Larven: dood organisch materiaal, algen en planten.
Leefwijze door het jaar heen	Jonge dieren dagactief; volwassen padden nachtactief. Overwintering vanaf oktober tot half maart. De trek naar het voortplantingswater is niet massaal en vindt plaats tussen maart tot begin juni. De voortplantingstijd loopt van april tot half augustus. Binnen de voortplantingsperiode zijn er meerdere perioden waarin eieren worden afgezet, meestal na hevige regenbuien. Vanaf juli kruipen de jongen uit het water. Van de volwassen dieren blijven de mannetjes veel langer in het water dan de vrouwtjes. Na 2 jaar zijn de jonge padden geslachtsrijp.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vernatting en ontsnippering.</li><li>- Openhouden van terreinen.</li><li>- De rugstreepad is gevoelig voor waterpeilverhogingen in de winter.</li></ul>
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	Vooral in het westen (in de duinen en delen van de polders), op de Waddeneilanden, en langs de grote rivieren.
Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	Bijlage IV
FF-wet	Tabel 3
Bronnen	Van Diepenbeek en Creemers, 2006. Scheffers en Cuppen, 2005. Nöllert en Nöllert, 2001. Websites: <a href="http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl">www.minlnv.nederlandsesoorten.nl</a> ; <a href="http://www.stowa.nl">www.stowa.nl</a>