




## Tabel 3

## Ruige dwergvleermuis *Pipistrellus nathusii*



Kleine vleermuis (kop-romp: ca. 5,5 cm).  
Vachtkleur donkerbruin of roodbruin.  
Kleine, zwarte, ronde oren en zeer korte, afgeronde tragus. Verwarring mogelijk met gewone dwergvleermuis.

Foto: René Janssen/Buiten-Beeld



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

3



Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling mits gebruik gedragscode)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	<b>Zie gedragscode, aanvullend:</b> Periode waarin werkzaamheden dienen plaats te vinden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- In geval van zomerverblijfplaats: augustus t/m maart</li> <li>- In geval van winterverblijfplaats: april t/m september</li> <li>- In geval van paarverblijfplaats: november t/m juli</li> </ul> Pas nadat is vastgesteld dat de verblijfplaatsen zijn verlaten, kan worden gestart met werkzaamheden. Vliegroutes/lijnvormige landschapselementen in tact laten; niet alle bomen verwijderen. Bij verwijderen van lijnvormige landschapselementen die van belang zijn als vliegroute ontheffing aanvragen.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)

Vorbereiding van nieuwe werken	<b>Zie gedragscode</b>
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	-
Sloop kunstwerken en gebouwen	<b>Zie gedragscode, aanvullend:</b> Periode waarin werkzaamheden dienen plaats te vinden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- In geval van zomerverblijfplaats: augustus t/m maart</li> <li>- In geval van winterverblijfplaats: april t/m september</li> <li>- In geval van paarverblijfplaats: november t/m juli</li> </ul> Pas nadat is vastgesteld dat de verblijfplaatsen zijn verlaten, kan worden gestart met werkzaamheden.
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven wateren	-

Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Ruige dwergvleermuis *Pipistrellus nathusii*

Leefgebied	Half open, bosrijke landschappen
Gebruik van het leefgebied	<i>Zomerverblijven</i> : bomen, soms in huizen. <i>Winterverblijven</i> : bomen, soms in gebouwen. <i>Foerageergebied</i> : bos, bomenlanen, houtwallen, open plekken in bos, boven water. <i>Vliegroutes</i> : lijnvormige landschapselementen (o.a. lanen, paden, bosrand). <i>Paarplaatsen</i> : oude loofbossen, bomenlanen, landgoederen, onder daklijsten van gebouwen. Trek over grote afstanden (tot ca. 2000 km.).
Voornaamste voedselbronnen	Kleine en middelgrote insecten
Leefwijze door het jaar heen	Seizoensmigratie. In najaar verplaats vrijwel de hele populatie van Noord-, Midden-, en Oost-Europa zich naar West-Europa. Mogelijk is een deel van de populatie in Nederland honkvast. Kraamkolonies in Nederland incidenteel waargenomen. Kraamtijd: mei-juli. Paartijd: half augustus-half oktober. Winterslaap: oktober-maart.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Herplant van singels, bomenrijen.</li><li>- Fragmentatie opheffen.</li><li>- Sparen van een deel van de oude bomen bij boskap.</li><li>- (Gedeeltelijk) sparen van houtwallen, singels bij opruimen van wallen en kap van singels.</li><li>- Aanbrengen van vleermuizenkasten, met name aan bomen zonder holten.</li></ul>
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Algemeen. In vrijwel geheel Nederland met zwaartepunt in noordelijk, westelijk en centrale deel van het land. In Limburg en droge zandgronden (o.a. Veluwe, Twente, Kempen) schaarser.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	Bijlage IV
FF-wet	Tabel 3
Bronnen	Lange <i>et al.</i> 1994; Broekhuizen <i>et al.</i> 1992; Limpens <i>et al.</i> 1997; Websites: <a href="http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl">www.minlnv.nederlandsesoorten.nl</a>