




Tabel 2

Ruig klokje *Campanula trachelium*



Een plant van 60 tot 90 cm hoog. Ruig klokje is sterk behaard. De plant bloeit met licht violette of paarse klokjes. De stengel heeft scherpe kanten en de bladeren zijn min of meer rond en ovaal.
Foto: Saskia Vleeming



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Om de 2-3 jaar maaien. In september-oktober of vóór juni.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Schaduwgevend bomen of struiken laten staan.
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods de plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten, onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	-
Groeiplaats	Een plant van vochtige, matig voedselrijke grond. Op lemige en kalkhoudende grond waar geen dik strooiselpakket aanwezig is. Ruig klokje groeit optimaal in halfschaduw. De soort is karakteristiek voor niet te dicht eiken-haagbeukenbos en komt daarnaast ook voor in boszomen, tussen hakhout, in heggen, spoorbermen, steile randen en op beschaduwde (beek)oevers.

Leefwijze door het jaar heen
Bloeiperiode: juli-augustus. Zaadverspreiding vanaf augustus tot in de winter via wind en regenwater. Het zaad kan langer dan vijf jaar kiemkrachtig blijven. De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen op of onder de grond.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Ruig klokje *Campanula trachelium*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Verruiging door grote brandnetel tegengaan door invloed van bemesting te beperken en beschaduwing door bomen (overstaanders) in stand te houden. Echter eveneens voorkomen dat groeiplaatsen dichtgroeien met dicht struikgewas.- In bossen: instandhouden hakhoutbeheer (bijvoorbeeld middenbos).
Verspreiding binnen Nederland	Plaatselijk vrij algemeen in Zuid-Limburg en aan de binnenduinrand. Daarnaast op enkele plekken in de heuvelgebieden, bij Winterswijk en aan de rand van rivierdalen in Limburg, Gelderland en Overijssel. Ruig klokje is alleen in het zuidoosten oorspronkelijk inheems. Op andere plaatsen, zoals de binnenduinrand is hij verwilderd uit tuinen.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang.
Status Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005. Schaminée, 1996. Websites: flora.instnat.be