



Scholekster *Haematopus ostralegus*



Vrij grote, compacte steltloper. Verenkleeft grotendeels met zwarte bovendelen en witte onderdelen. De snavel is vrij lang en oranje.

Foto: Eelke Schoppers



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september t/m maart. De scholekster is een weidevogel. Hij broedt op de grond in korte, dichte vegetatie, onder meer in de kwelder en in weilanden of tussen grind op platte daken.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Bij voorkeur van september t/m maart in gebieden met akkers en open grasland waar de soort voorkomt. De scholekster is een weidevogel. Hij broedt op de grond in korte, dichte vegetatie, onder meer in de kwelder en in weilanden of tussen grind op platte daken.
Slopen kunstwerken/gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt in open gebieden met een lage vegetatie en een hoge waterstand. Soms ook tussen grind op platte daken. In de winter voornamelijk verblijvend aan de kust.
Gebruik van het leefgebied	In het broedseizoen in kwelders, weilanden, akkers, duinen en stedelijk gebied (platte daken). Buiten het broedseizoen voornamelijk in gebieden met slik.
Voornaamste voedselbronnen	Regenwormen, emelten en overige ongewervelden.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin april tot eind augustus. Vanaf begin april balts en van midden april-eind augustus nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen in onbegroeide, natte gebieden met zand en/of slik.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Scholekster *Haematopus ostralegus*

Locatie nest	Nest op de grond, in korte dichte vegetatie in kwelder of in weiland. Ook broedend op platte daken.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Beheer van veenweidegebieden extensiveren; minder en later maaien, beweiden en bemesten.- Vermijden van betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen in heel Nederland met uitzondering van de Veluwe, Utrechtse heuvelrug en Zuid-Limburg.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: van de Kam <i>et al.</i> , 1999; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

