



Slobeend *Anas clypeata*



Middelgrote eend, met een korte hals en lange brede snavel. Een volwassen mannetje heeft een groene kop, een witte borst en een roodbruine flank. Een volwassen vrouwtje is lichtbruin gebandeerd.

Foto: Rein Hofman



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

| | |
|-------------------------|---|
| Maaien | Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september tot half maart. Slobeenden broeden op de grond, vaak in riet of zeggenvegetaties nabij water. |
| Schonen | Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien. |
| Baggeren | Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien. |
| Snoeien/dunnen | - |
| Onderhoud waterkeringen | - |
| Onderhoud verhardingen | - |

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

| | |
|---|---|
| Vorbereiding van nieuwe werken | Zie gedragscode |
| Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden | Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september tot half maart. Slobeenden broeden op de grond, vaak in riet of zeggenvegetaties nabij water. |
| Slopen kunstwerken/gebouwen | Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond. |
| Bouwactiviteiten | Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond. |
| Afdammen/dempen/vergraven | Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond. |
| Leefgebied | Broedt in gebieden met vochtige graslanden met krekken en sloten. Verblijft in de winter in moerassen, ondiepe meren en open veengebieden. |
| Gebruik van het leefgebied | Jaarrond te vinden in waterrijke gebieden. In de winter talrijker door aanvulling van overwinterende populaties uit Noord- en Oost-Europa. |
| Voornaamste voedselbronnen | Plankton, kleine aquatische organismen en zaden. |
| Leefwijze door het jaar heen | De broedperiode loopt van midden maart tot eind augustus. Midden maart balts, van begin april-september nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen zijn de vogels in groepen te vinden op open en beschutte wateren. |
| Locatie nest | Op de grond in open tot dichte riet- of zeggenvegetatie, meestal in de nabijheid van water. Vervolg: zie pagina 2 |



Vervolg

Slobeend *Anas clypeata*

| | |
|----------------------------------|---|
| Aanbevelingen | <ul style="list-style-type: none">- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in gebieden met concentraties eenden in het winterseizoen (september-april). |
| Belang waterschapspopulaties | Groot nationaal belang |
| Verspreiding binnen Nederland | In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Zeeland en het rivierengebied. |
| Rode lijst | Kwetsbaar |
| BeschermingsstatusVogelrichtlijn | Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen. |
| FF-wet | Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3 |
| Bronnen | Literatuur: van de Kam <i>et al.</i> 1999; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org |

