



Smient *Anas penelope*



Middelgrote eend, met korte hals en grote ronde kop, kleine snavel en spitse staart. Een volwassen mannetje heeft een kastanjebruine kop en hals, met een roomgeel voorhoofd. Een volwassen vrouwtje is uniform donker rossig bruin tot grijs.

Foto: Martin Bonte

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half augustus tot half april. Smienten broeden doorgaans op de grond in riet- of zeggenvegetaties nabij water.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half augustus tot half april. Smienten broeden doorgaans op de grond in riet- of zeggenvegetaties nabij water.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt op oevers in moerassen, meren en open veengebieden.
Gebruik van het leefgebied	Jaarrond te vinden in waterrijke gebieden. In de winter talrijker door aanvulling van overwinterende populaties uit Noord- en Oost-Europa.
Voornaamste voedselbronnen	Voornamelijk waterplanten, maar in het broedseizoen ook insecten.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van midden april tot midden augustus. Midden april balts, van begin mei-september nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen zijn de vogels in grote groepen te vinden op open en beschutte wateren.
Locatie nest	Op de grond in dichte riet- of zeggenvegetatie in de nabijheid van water.

Vervolg: zie pagina 2



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker





Vervolg

Smient *Anas penelope*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen. Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in gebieden met concentraties eenden (dagrustplaatsen) in het winterseizoen.
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen in kleine aantallen in Zuid-Holland, Utrecht, Friesland en het rivierengebied.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: van de Kam <i>et al.</i> 1999; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

