



## Tureluur *Tringa totanus*



Een middelgrote steltloper met rode poten en oranjerode snavelbasis. Bovenzijde bruin. Onderzijde met gestreepte borst en flanken.

Foto: Martin Bonte



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september t/m maart. De tureluur broedt op de grond, vaak in een hoge pol gras.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september t/m maart. De tureluur broedt op de grond, vaak in een hoge pol gras.
Sloop kunstwerken/gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt in lage, vaak natte, open graslanden, oevers van grote wateren en moerasgebieden. In de winter voornamelijk verblijvend aan de kust. Een deel van de vogels trekt naar het zuiden.
Gebruik van het leefgebied	In het broedseizoen in open weidegebieden en moerassen. In de winter voornamelijk verblijvend aan de kust. Een deel van de vogels trekt naar het zuiden.
Voornaamste voedselbronnen	Hoofdzakelijk ongewervelden.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin april tot midden september. Vanaf begin april balts en van midden april-midden september nesten en paren met jongen. In de winter voornamelijk verblijvend aan de kust. Een deel van de vogels trekt naar het zuiden.

Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Tureluur *Tringa totanus*

Locatie nest	Nest op de grond, vaak in een hoge pol gras.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.</li><li>- Beheer van veenweidegebieden extensiveren (minder en later maaien, beweiden en bemesten).</li><li>- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.</li></ul>
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in hoge dichtheden in Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en het rivierengebied.
Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: van de Kam <i>et al.</i> 1999; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: <a href="http://www.minlnv.nl">www.minlnv.nl</a> ; <a href="http://www.nederlandsesoorten.nl">www.nederlandsesoorten.nl</a> ; <a href="http://www.bto.org">www.bto.org</a>

