




Tabel 1

Tweekleurige bosspitsmuis *Sorex coronatus*



Lijkt op gewone bosspitsmuis. Donkerbruine tot zwartbruine rug, lichtgrijze onderzijde. Bruine zone op flanken is smaller dan bij gewone bosspitsmuis of ontbreekt; hierdoor maken de dieren een tweekleurige indruk.

Foto: Wesley Overman/Buiten-Beeld



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

1

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Gefaseerd maaien in ruimte en tijd
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	-
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten ruimte en tijd	Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	-
Leefgebied	Vergelijkbaar met dat van gewone bosspitsmuis; mijdt vochtige terreinen. Diverse biotopen met (dichte) bodembedekkende vegetatie. Ruig grasland, bermen, heide, duinen, rietvelden, bossen.
Gebruik van het leefgebied	Vergelijkbaar met dat van gewone bosspitsmuis. Leeft 's winters overwegend ondergronds, in zomer overwegend bovengronds. Nesten worden meestal bovengronds gemaakt. Gangen worden niet door de tweekleurige bosspitsmuis zelf gegraven, maar er wordt gebruik gemaakt van gangen van andere kleine zoogdieren. Grote schommelingen in aantallen tussen de jaren.
Voornaamste voedselbronnen	Vergelijkbaar met gewone bosspitsmuis. Kevers, pissebedden, wormen, spinnen, slakken.
Leefwijze door het jaar heen	Vergelijkbaar met gewone bosspitsmuis. Dag- en nachtactief, met name in avond en voornacht. Over een etmaal wisselen 10 periodes van activiteit en rust elkaar af. Territoriumgrootte: 400-650 m ² . Het voortplantingsseizoen loopt van april-augustus. Grote schommelingen in aantallen tussen de jaren.
Aanbevelingen	- Behoud en aanleg van kleine landschapselementen. - Door maaisel niet af te voeren, maar te verwerken in hopen, worden extra schuilgelegenheden gecreëerd.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Tweekleurige bosspitsmuis *Sorex coronatus*

Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Algemeen. Verspreid in vrijwel heel Nederland, op de Waddeneilanden alleen op Terschelling. Zwaartepunt van de verspreiding ligt in oostelijk Nederland.
Rode lijst 2004	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Lange <i>et al.</i> 1994; Broekhuizen <i>et al.</i> 1992; Website: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl