




Tabel 1

Veldmuis *Microtus arvalis*



Woelmuissoort. Lijkt sterk op aardmuis. Vacht maakt kortharige, gladde indruk. Rugzijde dof geel- tot grijsbruin, lichter dan bij aardmuis. Buikzijde vuilwit tot lichtgrijs. Altijd een gedeelte van oorschelp zichtbaar.

Foto: René Janssen/Buiten-Beeld



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

1

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Gefaseerd maaien in ruimte en tijd
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	-
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	-
Leefgebied	Voornamelijk in open cultuurland. Kort, niet te vochtig gras-, wei-, of akkerland, boomgaarden, wegbermen en dijken. In vegetatiestructuren met 1 laag is veldmuis dominant, in structuren met 3 lagen de aardmuis. In structuren met twee lagen is vochtigheid bepalend: veldmuis is dominant in droge biotopen.
Gebruik van het leefgebied	Maken gangen dicht onder de oppervlakte met nest-, eet- en voorraadkamers. Soms wordt nest bovengronds aangelegd. Bovengrondse paden verbinden de gangen.
Voornaamste voedselbronnen	Voornamelijk groene delen van grassen en kruiden; zaden, ondergrondse plantendelen, vruchten, schors
Leefwijze door het jaar heen	Met name in avondschemer en 's nachts actief. Per etmaal ca. 10 perioden van activiteit. In zomer leven mannetjes en vrouwtjes paarsgewijs in territoria. 's Winters is de sociale structuur onduidelijk en overlappen leefgebieden elkaar. Gemiddelde actie-radius: 6-8 m. Voortplantingstijd: maart-oktober. Periodieke dichtheidsfluctuaties (cyclus van 3 jaar).
Aanbevelingen	- Behoud en aanleg van kleine landschapselementen. - Door maaisel niet af te voeren, maar te verwerken in hopen, worden extra schuilgelegenheden gecreëerd.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Veldmuis *Microtus arvalis*

Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Algemeen voorkomend in heel Nederland m.u.v. de Waddeneilanden (wel op Ameland).
Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Lange <i>et al.</i> 1994; Broekhuizen <i>et al.</i> 1992; Website: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl