



Tabel 3

Veldspitsmuis *Crocidura leucodon*



Bovenzijde middelbruin tot zwartbruin en scherp afgezet tegen de (grauw)witte onderzijde. Bij jonge dieren contrast tussen rug en buik minder groot. Staart is tweekleurig met lange zilvergrijze haren. Oren steken duidelijk uit de vacht.

Foto: Dimitri Emond/Bureau Waardenburg



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

3

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Gefaseerd maaien in ruimte en tijd. Bij voorkeur in de periode september t/m maart.
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	Zie gedragscode, aanvullend: Extensieve beweiding (<0,5 grootvee-eenheid/ha). Landschapselementen in tact laten. Niet alle bomen verwijderen Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd. Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in de periode september t/m maart.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (onthefpingsplicht)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden in ruimte en tijd. Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in de periode september t/m maart. Voorafgaand aan graafwerkzaamheden de vegetatie kort maaien.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven wateren	-

Leefgebied
In kleinschalige agrarische cultuurlandschappen, met name in overgangsvegetaties en lintvormige landschapselementen zoals hagen, houtwallen en bosranden. Ook in aanliggende, braakliggende of onbegaasde kruidenvegetaties en boomgaarden met opgaande kruidenvegetatie.

Gebruik van het leefgebied
Het nest bevindt zich vlak onder de oppervlakte. Voedsel wordt gezocht in dichte, kruidachtige vegetaties. Overwintering vindt grotendeels plaats in hagen, houtwallen of bosranden.

Voornaamste voedselbronnen
Op en in de bovenste bodemlaag levende ongewervelden, waaronder kevers, larven en wormen.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Veldspitsmuis *Crocidura leucodon*

Leefwijze door het jaar heen	Leefwijze is met name 's winters sociaal. Meerdere dieren maken dan gebruik van hetzelfde nest. Het voedsel zoeken vindt 24 uur per dag plaats met tussenposen van 3 tot 4 uur. Voortplantingstijd: april-september.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Behoud en aanleg van kleinschalige landschapselementen met kruidenrijke vegetatie.- Extensief beheer van bermen, slootkanten, houtwallen, etc.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Zeer zeldzaam. Komt alleen voor in Zeeuws-Vlaanderen en het oosten van Overijssel.
Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 3
Bronnen	Lange <i>et al.</i> 1994; Broekhuizen <i>et al.</i> 1992; Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl