



Velduil *Asio flammeus*



Middelgrote uil met zeer lange, slanke vleugels, gele ogen en korte oorpluimen. Gestreepte bovenzijde geelbruin, onderzijde beige, borst gestreept. Veerkrachtige, schommelende vlucht met roeiende vleugelslagen.

Foto: Rein Hofman



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Als de soort (mogelijk) voorkomt alleen maaien in de periode van half september tot half maart. Velduilen broeden op de grond, meestal in de dekking van hoog gras of ruigte.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Als de soort (mogelijk) voorkomt alleen maaien in de periode van half september tot half maart. Velduilen broeden op de grond, meestal in de dekking van hoog gras of ruigte.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	-
Leefgebied	Broedt in natuurlijke, open terreinen met weinig menselijke verstoring zoals schorren, kwelders en kale duinen.
Gebruik van het leefgebied	Broedt en rust op de grond. Jaagt overdag, in de schemering of 's nachts, vanuit langzame vlucht boven het broedbiotoop of aanliggende cultuurgraslanden. Groot deel van Nederlandse broedvogels overwintert in het broedgebied, een klein deel trekt weg naar het zuiden. 's Winters aanvulling vanuit noordelijkere streken en soms in (grotere) groepen overwinterend op muizenrijke locaties (o.a. ruige velden, maar ook hoogveengebieden en heidevelden).
Voornaamste voedselbronnen	Bijna uitsluitend woelmuizen, zelden ook makkelijk te vangen vogels (bijvoorbeeld meeuwenkuikens).
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van half maart tot half september. Eieren en jongen zijn aanwezig van half april tot begin juni. Vliegvlugge jongen zijn rond de broedlocaties aanwezig tot half september.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Velduil *Asio flammeus*

Locatie nest	Op de grond, meestal in de dekking van hoog gras of ruigte.
Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Verruigen van leefgebieden tegenaan om een hoge dichtheid aan woelmuizen te waarborgen. Essentieel hierbij is het creëren en handhaven van een mozaïek van onbegroeide delen, kortgrazige vegetatie, ruige delen (en de overgangen daartussen) en aanliggende kleinschalige akkers en cultuurgraslanden, ruige slootkanten.- Instellen van permanente rustgebieden in delen van grote, open natuurgebieden langs de kust.
Belang Waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang.
Verspreiding binnen Nederland	Zeer schaarse broedvogel op de Waddeneilanden, rond Schiphol en op het Friese en Groningse wad.
Rode lijst 2004	Ernstig bedreigd.
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Streng beschermd, gelijkgesteld aan tabel 3. Jaarrond beschermd nest.
Bronnen	Literatuur: Bijlsma <i>et al.</i> 2001; LNV, 2009; Snow & Perrins 1998; SOVON 2002 Websites: www.minlnv.nl , www.nederlandsesoorten.nl .

