



Tabel 1

Vos *Vulpes vulpes*



Hondachtige. Rug en flanken geelbruin tot roodbruin. Onderzijde grijs tot bijna wit.

Foto: Agnes Bax/Buiten-Beeld



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

1

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Rondom hol (straal ca. 25 m) vinden werkzaamheden bij voorkeur plaats in de periode september t/m februari.
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	Rondom hol (straal ca. 25 m) vinden werkzaamheden bij voorkeur plaats in de periode september t/m februari.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	-
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Bij aantasting (directe omgeving) hol vinden werkzaamheden bij voorkeur plaats in de periode september t/m februari. Hol handmatig afgraven en eventueel aanwezige dier(en) gelegenheid geven te vluchten.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	Bij aantasting (directe omgeving) hol vinden werkzaamheden bij voorkeur plaats in de periode september t/m februari. Hol handmatig afgraven en eventueel aanwezige dier(en) gelegenheid geven te vluchten.
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	-
Leefgebied	Bosrijke gebieden, parklandschap, heide, venen, duinen, polders, agrarisch en stedelijk gebied.
Gebruik van het leefgebied	Holen worden bij voorkeur gegraven in dekking; bij kleine landschapselementen, bosschages.
Voornaamste voedselbronnen	Alleseter. Kleine zoogdieren (vooral woelmuizen), vogels, eieren, regenwormen, kevers, vruchten, aas.
Leefwijze door het jaar heen	Overwegend schemer- en nachtactief. Territoriaal. Territoriumgrootte: 100-400 ha. Maken (deel van het jaar) gebruik van (ondergrondse) hollen; met name voor het werpen en grootbrengen van de jongen. Ranstijd loopt van december tot februari. Jongen worden in maart geboren. Na 6-12 maanden zijn de jongen zelfstandig.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Vos *Vulpes vulpes*

Aanbevelingen	-
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	Algemeen. Verspreid in heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden. Zwaartepunt van de verspreiding ligt in West Nederland op de hogere gronden; daarnaast ook in de Hollandse duinen. Komt relatief weinig voor op de Zeeuwse eilanden, West-Brabant en de Hollandse polders.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Lange <i>et al.</i> 1994; Broekhuizen <i>et al.</i> 1992; Website: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl