



## Waterhoen *Gallinula chloropus*



Donkere vogel met een korte, rechte snavel. Snavel en voorhoofd zijn rood, de snavelpunt is geel. Op de flanken is een dunne witte lijn aanwezig. De onderstaart is wit, de poten zijn groen.

Foto: Ruben Fijn



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van oktober t/m maart. Het waterhoen broedt op vegetatie in water of in dichte vegetatie langs de oever.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van oktober t/m maart. Het waterhoen broedt op vegetatie in water of in dichte vegetatie langs de oever.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt in beschutte voedselrijke wateren, vaak met dichte oevervegetatie.
Gebruik van het leefgebied	Jaarrond te vinden in gebieden met kleine wateren.
Voornaamste voedselbronnen	Planten, insecten, zaden en vruchten.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin april tot eind september. Vanaf midden april balts, van mei-september nesten en paren met jongen.
Locatie nest	Op vegetatie in water of in dichte oevervegetatie.
Aanbevelingen	- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode. - Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.

Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Waterhoen *Gallinula chloropus*

Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen in geheel Nederland met uitzondering van de hoge zandgronden.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	-
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: <a href="http://www.minlnv.nl">www.minlnv.nl</a> ; <a href="http://www.nederlandsesoorten.nl">www.nederlandsesoorten.nl</a> ; <a href="http://www.bto.org">www.bto.org</a>

