



## Wespendief *Pernis apivorus*



Een middelgrote roofvogel met brede, lange vleugels en een afgeronde staart. In vlucht met dunne hals en naar voren gestoken kop. Staart met enkele donkere banden. Verenkleeft variabel, maar onderlichaam voornamelijk gebandeerd, gevlekt of egaal donkerbruin.

Foto: Daniele Occhiato/  
Buiten-Beeld



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Nesten zijn jaarrond beschermd. Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	-
Schonen	-
Baggeren	-
Snoeien/dunnen	<b>Zie gedragscode, aanvullend:</b> Nesten van in bomen broedende roofvogels zijn jaarrond beschermd. De wespendief maakt een nest of gebruikt oude nesten van kraai en buizerd in loof- en naaldbos. Snoeien alleen van oktober t/m april.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	<b>Zie gedragscode</b>
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	-
Sloop kunstwerken/gebouwen	-
Bouwactiviteiten	<b>Zie gedragscode, aanvullend:</b> Waar de soort (mogelijk) broedt: van oktober t/m april.
Afdammen/dempen/vergraven	-
Leefgebied	Broedt in loof- en gemengde bossen en bosranden. In de winter verblijvend in tropisch Afrika.
Gebruik van het leefgebied	In volgroeid bos voor nestgelegenheid in combinatie met open gebieden voor voedsel.
Voornaamste voedselbronnen	Insecten, waarvan voornamelijk wespen. In mindere mate vormen vogels een voedselbron.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin mei tot eind september. Vanaf begin mei balts en van midden mei-eind september nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen verblijven de vogels in tropisch Afrika.
Locatie nest	Maakt nest of gebruikt oude nesten van kraai en buizerd in loof- en naaldbos.
Aanbevelingen	- Let op: nesten zijn jaarrond beschermd - Vermijden van betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.

**Vervolg: zie pagina 2**



## Vervolg

## Wespendief *Pernis apivorus*

Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland vrij algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden. Zeldzaam in de kustprovincies.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: Bijlsma <i>et al.</i> , 2003; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: <a href="http://www.minlnv.nl">www.minlnv.nl</a> ; <a href="http://www.nederlandsesoorten.nl">www.nederlandsesoorten.nl</a> ; <a href="http://www.bto.org">www.bto.org</a>

