



## Tabel 1

## Wezel *Mustela nivalis*



Kleine marterachtige met een lang, smal lichaam, korte poten en rechtopstaande oren. De mannetjes zijn twee keer zo groot als de vrouwtjes. De rug is bruin en de buik wit. Te onderscheiden van de hermelijn door de kortere, bruinere staart zonder zwart staartpuntje. In het algemeen is de wezel kleiner dan de hermelijn

Foto: Buiten-Beeld



- soort niet waargenomen
- soort (recent) waargenomen

1

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)

Maaien	Minimaal 25% van de vegetatie sparen; maaisel in hopen verwerken.
Schonen	-
Baggeren	-
Begrazen	-
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkeling & inrichting (vrijstelling)

Vorbereiding van nieuwe werken	-
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	-
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/ vergraven wateren	-
Leefgebied	Kleinschalige landschappen met hoge vegetaties, ruige slootkanten, houtwallen, heggen, overhoekjes e.d.. Voorkeur voor droge gebieden.
Gebruik van het leefgebied	De grootte van het leefgebied is bij voldoende voedselaanbod niet groter dan een paar hectare. Het leefgebied van het vrouwtje is kleiner dan dat van het mannetje. In het leefgebied liggen diverse schuilplaatsen: verborgen hoekjes of bestaande gaten of holten (boomholten, muizenholen, rattenholen, mollennesten, takkenstapels, etc.). In open gebieden zijn wezels geneigd ondergronds te leven.
Voornaamste voedselbronnen	Woelmuizen (veldmuis, aardmuis en rosse woelmuis) en spitsmuizen. Soms vogels en hun eieren.
Leefwijze door het jaar heen	's nachts en overdag actief. Wezels kunnen het gehele jaar door paren, maar de piek ligt in februari tot en met april. Na een draagtijd van één maand worden gemiddeld 5 tot 7 jongen geboren. Bij voldoende voedselaanbod kunnen twee nesten per jaar grootgebracht worden. Het vrouwtje zorgt alleen voor de jongen. Na 2 tot 3 maanden zijn de jongen zelfstandig. Vanaf dan leven wezels elk in hun eigen leefgebied. Wel kunnen de leefgebieden van een mannetje overlappen met die van één of meerdere vrouwtjes.

Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Wezel *Mustela nivalis*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Behoud en aanleg van kleine landschapselementen.</li><li>- Gefaseerd maaien van hooilanden en rietkragen, zodat voldoende vegetatie blijft staan voor schuilgelegenheid. Door het maaisel niet af te voeren, maar te verwerken in hopen, worden extra schuilgelegenheden gecreëerd.</li><li>- Aanleggen van natuurvriendelijke oevers</li><li>- Aanplanten of handhaven van bes- of noten-dragende planten. Hiermee wordt de muizenpopulatie begunstigd.</li><li>- In open landschappen: schuilhopen opwerpen of marterkasten plaatsen.</li></ul>
Belang waterschapspopulaties	Nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	Verspreid over het hele land met uitzondering van de Waddeneilanden.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 1
Bronnen	Lange <i>et al.</i> , 2004. Bode <i>et al.</i> , 1999. Jonker en Mulder, 1994.