



## Wilde eend *Anas platyrhynchos*



Grote, compacte eend met een donkerblauwe spiegel met witte randen. Een volwassen mannetje heeft een groene kop met witte halsring en donkerbruine borst. Een volwassen vrouwtje is bruin met donkerbruine bandering.

Foto: Ruben Fijn/

Bureau Waardenburg



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van oktober tot half februari. Wilde eenden broeden op de grond nabij water, op diverse beschutte locaties zoals dichte vegetatie, holle bomen, kunstmatige holten en nestkasten.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van oktober tot half februari. Wilde eenden broeden op de grond nabij water, op diverse beschutte locaties zoals dichte vegetatie, holle bomen, kunstmatige holten en nestkasten.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt op oevers van diverse kleine en grote zoete wateren.
Gebruik van het leefgebied	Jaarrond te vinden in waterrijke gebieden. In de winter talrijker door aanvulling van overwinterende populaties uit Noord- en Oost-Europa.
Voornaamste voedselbronnen	Gras, waterplanten, zaden, en kleine aquatische organismen.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van midden februari tot eind september. Eind februari balts, in maart-september nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen verblijven de vogels op kleine en grote wateren.



Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Wilde eend *Anas platyrhynchos*

Locatie nest	Op de grond in de nabijheid van water en op diverse beschutte locaties bij water, zoals dichte vegetatie, holle bomen, kunstmatige holten en nestkasten.
Aanbevelingen	-
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen algemeen in heel Nederland.
Rode lijst	-
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: van de Kam <i>et al.</i> 1999; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: <a href="http://www.minlnv.nl">www.minlnv.nl</a> ; <a href="http://www.nederlandsesoorten.nl">www.nederlandsesoorten.nl</a> ; <a href="http://www.bto.org">www.bto.org</a>

