




Tabel 2

Wilde kievitsbloem *Fritillaria meleagris*



Een plant van 20 tot 50 cm. Wilde kievitsbloem heeft lange, smalle bladeren en knikkende klokvormige bloemen. De bloemen zijn paars met wit gevlekt in een schaakbordpatroon. Soms zijn de bloemen geheel wit.

Foto: Janneke van Goethem



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode, aanvullend: Begrazing vanaf juni mogelijk.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten onder begeleiding van een deskundige.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Geen grootschalige ingrepen in de waterhuishouding doorvoeren.

Groeiplaats
Een landplant van zonnige tot halfbeschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke (vaak licht bemeste) grond. Vooral op 'klei op veen' of op bodems met klei- en veenlagen gecombineerd met zandig bodemmateriaal. Groeit in graslanden, vooral in uiterwaarden. Zelden in lichte bossen en struikgewas. De plant staat vaak op plaatsen die 's winters onder water staan en zomers oppervlakkig uitdrogen. De aanvoer van kwel kan eveneens een rol spelen.

Leefwijze door het jaar heen
Bloeiperiode: april-mei. De plant bloeit pas na enkele jaren. Zaadverspreiding in juni-juli via water. Het zaad blijft enkele jaren kiemkrachtig. De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen onder de grond.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Wilde kievitsbloem *Fritillaria meleagris*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Niet ontwateren, kwelstromen intact laten.- Niet zwaar bemesten, eutrofiering door overstromingswater voorkomen. Eutrofiering echter niet volledig achterwege laten.- Laat in het jaar maaien of beweiden.
Verspreiding binnen Nederland	Vooral langs het Zwarte water, ook langs de benedenloop van de Overijsselse vecht en de IJssel. Op enkele plekken in Zuid Holland. Ook als stinzenplant, bijvoorbeeld in oude landgoederen langs de Utrechtse Vecht en langs de binnenduinrand.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang.
Status Rode lijst	Bedreigd
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005. Schaminée <i>et al.</i> , 1996. Websites: flora.instnat.be