



## Wintertaling *Anas crecca*



Kleine eend met een korte hals en een groene spiegel. Een volwassen mannetje heeft een bruine kop met groene zijden en een gele anaalstreek. Een volwassen vrouwtje is bruin met donkere vlekken.

Foto: Daniele Occhiato/Buiten-Beeld



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september t/m maart. De wintertaling broedt op oevers in waterrijke gebieden met een dichte oeverbegroeiing.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van half september t/m maart. De wintertaling broedt op oevers in waterrijke gebieden met een dichte oeverbegroeiing.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt op oevers in waterrijke gebieden met een dichte oeverbegroeiing.
Gebruik van het leefgebied	Jaarrond te vinden in waterrijke gebieden. In de winter talrijker door aanvulling van overwinterende populaties uit Noord- en Oost-Europa.
Voornaamste voedselbronnen	Planten, aquatische organismen en zaden.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin april tot midden september. Begin april balts, in april-september nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen verblijven de vogels op kleine en grote wateren.
Locatie nest	Op de grond of vlak boven de grond in dichte vegetatie. Altijd in de nabijheid van water. Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Wintertaling *Anas crecca*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.</li><li>- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.</li><li>- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in gebieden met concentraties eenden in het winterseizoen (oktober-april).</li></ul>
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in Drenthe, Noord-Brabant, Noord-Holland, Friesland en Zuid-Holland.
Rode lijst	Kwetsbaar
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: van de Kam <i>et al.</i> 1999; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: <a href="http://www.minlnv.nl">www.minlnv.nl</a> ; <a href="http://www.nederlandsesoorten.nl">www.nederlandsesoorten.nl</a> ; <a href="http://www.bto.org">www.bto.org</a>

