




## Woudaap *Ixobrychus minutus*



Een kleine geelbruine reiger. Een volwassen mannetje heeft een zwarte kruin en bovendelen. Een volwassen vrouwtje heeft een donkerbruine kruin en bovendelen.

Foto: Rein Hofman



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september t/m april. De woudaap broedt in dichte vegetatie (riet, russen, wilgen), meestal 5-15 meter van oever.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/ graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september t/m april. De woudaap broedt in dichte vegetatie (riet, russen, wilgen), meestal 5-15 meter van oever.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt in rietmoerassen met een ruim aanbod aan emerse rietvegetaties en in verlandingszones. In de winter verblijvend in Afrika.
Gebruik van het leefgebied	In het broedseizoen in rietzomen en andere dichte vegetaties langs dode rivierarmen, kleiputten, vijvers, voedselrijke vennen en laagveenmoerassen, met aanwezigheid van helder water.
Voornaamste voedselbronnen	Vis, amfibieën en kleine aquatische organismen.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin mei tot eind augustus. Vanaf begin mei balts en van midden mei-eind augustus nesten en paren met jongen. Buiten het broedseizoen overwinterend in Afrika.
Locatie nest	In dichte vegetatie (riet, russen, wilgen), meestal 5-15 meter van oever. Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Woudaap *Ixobrychus minutus*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.</li><li>- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.</li><li>- Soortgericht beheer door het landschap te behouden en in te richten aan de hand van de eigenschappen van het leefgebied, door ondermeer het stimuleren van natuurlijk waterpeilbeheer en structuurrijke moerasvegetatie (maatwerk).</li></ul>
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland zeldzaam en onregelmatig. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in de kerngebieden binnen het Vechtplassengebied en de Gelderse poort.
Rode lijst	Ernstig bedreigd
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Stengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: den Boer <i>et al.</i> , 2000; LNV, 2009; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: <a href="http://www.minlnv.nl">www.minlnv.nl</a> ; <a href="http://www.nederlandsesoorten.nl">www.nederlandsesoorten.nl</a> ; <a href="http://www.bto.org">www.bto.org</a>

