




## Tabel 2

## Zomerklokje *Leucojum aestivum*



Zomerklokje is 30 tot 60 cm hoog. De plant heeft smalle, lange bladeren en twee tot negen bloemen. De bloemen zijn wit met op het uiteinde van de blaadjes geelgroene vlekken.

Foto: Michel Geven/Buiten-Beeld



- soort niet aanwezig
- soort (recent) aanwezig

2

Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

### Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Eens in de 2 of 3 jaar, vanaf juli.
Schonen	Zie gedragscode
Baggeren	Zie gedragscode
Begrazen	Zie gedragscode, aanvullend: Extensieve begrazing is mogelijk.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten onder begeleiding van een deskundige.
Onderhoud verhardingen	Zie gedragscode

### Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mist gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten onder begeleiding van een deskundige.
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Groeiplaatsen ontzien of desnoods plant uitgraven en zo snel mogelijk opnieuw uitplanten onder begeleiding van een deskundige.
Sloop kunstwerken en gebouwen	-
Bouwactiviteiten	-
Afdammen/dempen/vergraven	-
Groeiplaats	Een water- of landplant van zonnige plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke grond. De groeiplaats staat periodiek onder water. De soort is kenmerkend voor natte, voedselrijke ruigtevegetaties en groeit in (buitendijkse) rietlanden, oeverruigtes, moerassige weilanden en wilgengrienden of andere natte bossen.

Leefwijze door het jaar heen  
Bloeiperiode: april-juni. Vruchtzetting vanaf juni. De zaden worden voornamelijk verspreid via het water doordat zaaddozen en zaden drijven. De plant vermeerdert zich ook vegetatief met behulp van vele ondergrondse uitlopers. De plant is meerjarig en overwintert met zijn knoppen onder de grond of onder water.

Vervolg: zie pagina 2



## Vervolg

## Zomerklokje *Leucojum aestivum*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Enige verruiging toelaten, maar te sterke verruiging van het rietland voorkomen.</li><li>- Rivierdynamiek in stand houden zodat de groeiplaatsen regelmatig worden overstroomd. Eventueel deze dynamiek nabootsen door in de winter water op de groeiplaats te laten komen (opzetten waterpeil).</li><li>- Overgangen klei en veen intact houden.</li></ul>
Verspreiding binnen Nederland	Oorspronkelijk als wilde plant aanwezig in het Zuid-Hollandse rivierengebied (van Leerdam tot Spijkennisse). Op andere plekken vaak onbewust aangevoerd met rietzoden of als tuinplant.
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Status Rode lijst	Kwetsbaar
Beschermingsstatus	
Habitatrichtlijn	-
FF-wet	Tabel 2
Bronnen	Weeda <i>et al.</i> , 2003. Van der Meijden, 2005. Schaminée, 1996. Riet <i>et al.</i> , 2005. Damm <i>et al.</i> , 2007. Websites: flora.instnat.be