




Zomertaling *Anas querquedula*



Een kleine eend, met een lange, rechte, donkere snavel. Een volwassen man heeft een witte oogstreep en donkerbruine kop en borst. Een volwassen vrouw heeft een gestreept koppatroon en een witte kin en keel.

Foto: Chris van Rijswijk/Buiten-Beeld



- soort niet broedend
- mogelijk broedgeval
- broedgeval waarschijnlijk/zeker

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg met ecooloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecooloog en mitigerende maatregelen worden genomen.

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september-maart maaien. De zomertaling broedt op de grond in dichte riet of zeggen vegetaties, meestal nabij water.
Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Snoeien/dunnen	-
Onderhoud waterkeringen	-
Onderhoud verhardingen	-

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

Vorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (mogelijk) broedt alleen in de periode van september-maart. De zomertaling broedt op de grond in dichte riet of zeggen vegetaties, meestal nabij water.
Slopen kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen bovengrond.
Leefgebied	Broedt langs beschutte, ondiepe stilstaande wateren in de nabijheid van vochtige graslanden. In de winter overwinterend in Afrika.
Gebruik van het leefgebied	In waterrijke gebieden. Overwintert in Afrika.
Voornaamste voedselbronnen	Waterplanten, kleine aquatische organismen en zaden.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin april tot eind augustus. Begin april balts, van april-augustus nesten en paren met jongen. De soort overwintert in Afrika.
Locatie nest	Op de grond in dichte vegetatie in riet of zeggen vegetatie, meestal in de nabijheid van water (< 20 m), maar tot 100 m afstand.

Vervolg: zie pagina 2



Vervolg

Zomertaling *Anas querquedula*

Aanbevelingen	<ul style="list-style-type: none">- Vermijd wijzigingen van het waterpeil binnen de voortplantingsperiode.- Vermijd betreding en het uitvoeren van werkzaamheden in potentiële broedbiotopen gedurende het broedseizoen.
Belang waterschapspopulaties	Groot nationaal belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland algemeen. Tijdens het broedseizoen voornamelijk in Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Overijssel, Groningen en het rivierengebied.
Rode lijst	Kwetsbaar
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: van de Kam <i>et al.</i> 1999; Snow & Perrins, 1998; SOVON, 2002. Websites: www.minlnv.nl ; www.nederlandsesoorten.nl ; www.bto.org

